

OPTILOR



Plan d'alimentation personnalisé

PRÉPARATION DE LA BUVÉE AU SEAU OU AU MÉLANGEUR

- Verser l'eau à 45-50 °C dans le récipient (environ la moitié du volume de buvée souhaité)
- Démarrer l'agitateur
- Verser progressivement la quantité d'aliment Denkavit correspondant à la concentration voulue par L de buvée. Délayer pendant 3 minutes.
- Compléter avec de l'eau pour atteindre le volume de buvée souhaité
- Distribuer la buvée lorsque sa température est de 41-42 °C

NE PAS OUBLIER

- Dès le 4^{ème} jour, distribuer à volonté eau, aliment concentré 1^{er} âge et paille renouvelés fréquemment
- Apport de Vitalcure : 10 g/repas d'AA pendant les 10 premiers jours
- Apport de Vitalfort : 50 g dans 2 l d'eau distribués entre les 2 repas d'AA, les 7 premiers jours

Pour toutes questions complémentaires, consulter votre distributeur

Semaine	Buvée (l)	Nbr de repas	g/l de buvée
0-3 jours	Colostrum		
4-7 jours	2	2	175
Semaine 2	2	2	175
Semaine 3	2	2	175
Semaine 4	4	1	175
Semaine 5	4	1	175
Semaine 6	4	1	175
Semaine 7	4	1	175
Semaine 8	3	1	175
Semaine 9	2	1	175

REMARQUES PARTICULIÈRES/ CONDITIONS D'EMPLOI

- *race des veaux, conditions climatiques, conditions sanitaires,*