

OPTILOR

2 REPAS/JOUR

PRÉPARATION DE LA BUVÉE

- Verser l'eau à 45-50 °C dans le récipient - environ la moitié du volume de buvée souhaité
- Démarrer l'agitateur
- Verser progressivement la quantité d'aliment Denkavit correspondant à la concentration voulue par L de buvée. Délayer pendant 3 minutes.
- Compléter avec de l'eau pour atteindre le volume de buvée souhaité
- Distribuer la buvée lorsque sa température est de 41-42 °C

RECOMMANDATIONS

- Passage à 1 repas par jour à partir de 4 semaines
- Apport de Vitalcure : 10 g/repas pendant les 10 premiers jours
- Apport de Vitalfort : 50 g dans 2 l d'eau distribués entre les 2 repas, les 7 premiers jours

Pour toutes questions complémentaires, consulter votre distributeur

QUANTITÉ À MÉLANGER POUR LE NOMBRE DE VEAUX INDIQUÉ

NB DE VEAU(X) NON SEVRÉ(S)	LITRAGE D'EAU CHAUDE (L)	ALIMENT D'ALLAITEMENT (KG)	LAIT RECONSTITUÉ (L)
1	1,8	0,4	2
2	3,5	0,7	4
3	5,3	1,1	6
4	7,0	1,4	8
5	8,8	1,8	10
6	10,5	2,1	12
7	12,3	2,5	14
8	14,0	2,8	16
9	15,8	3,2	18
10	17,6	3,5	20
11	19,3	3,9	22
12	21,1	4,2	24
13	22,8	4,6	26
14	24,6	4,9	28
15	26,3	5,3	30
16	28,1	5,6	32
17	29,8	6,0	34
18	31,6	6,3	36
19	33,3	6,7	38
20	35,1	7,0	40
21	36,9	7,4	42
22	38,6	7,7	44
23	40,4	8,1	46
24	42,1	8,4	48
25	43,9	8,8	50
26	45,6	9,1	52
27	47,4	9,5	54
28	49,1	9,8	56
29	50,9	10,2	58
30	52,7	10,5	60

OPTILOR

1 REPAS/JOUR

QUANTITÉ À MÉLANGER POUR LE NOMBRE DE VEAUX INDIQUÉ

NB DE VEAU(X) NON SEVRÉ(S)	LITRAGE D'EAU CHAUDE (L)	ALIMENT D'ALLAITEMENT (KG)	LAIT RECONSTITUÉ (L)
1	3,5	0,7	4
2	7,0	1,4	8
3	10,5	2,1	12
4	14,0	2,8	16
5	17,6	3,5	20
6	21,1	4,2	24
7	24,6	4,9	28
8	28,1	5,6	32
9	31,6	6,3	36
10	35,1	7,0	40
11	38,6	7,7	44
12	42,1	8,4	48
13	45,6	9,1	52
14	49,1	9,8	56
15	52,7	10,5	60
16	56,2	11,2	64
17	59,7	11,9	68
18	63,2	12,6	72
19	66,7	13,3	76
20	70,2	14,0	80
21	73,7	14,7	84
22	77,2	15,4	88
23	80,7	16,1	92
24	84,2	16,8	96
25	87,8	17,5	100
26	91,3	18,2	104
27	94,8	18,9	108
28	98,3	19,6	112
29	101,8	20,3	116
30	105,3	21,0	120

PRÉPARATION DE LA BUVÉE

- Verser l'eau à 45-50 °C dans le récipient - environ la moitié du volume de buvée souhaité
- Démarrer l'agitateur
- Verser progressivement la quantité d'aliment Denkavit correspondant à la concentration voulue par L de buvée. Délayer pendant 3 minutes.
- Compléter avec de l'eau pour atteindre le volume de buvée souhaité
- Distribuer la buvée lorsque sa température est de 41-42 °C

RECOMMANDATIONS

- Passage à 1 repas par jour à partir de 4 semaines
- Apport de Vitalcure : 10 g/repas pendant les 10 premiers jours
- Apport de Vitalfort : 50 g dans 2 l d'eau distribués entre les 2 repas, les 7 premiers jours

Pour toutes questions complémentaires, consulter votre distributeur