

ONLY



Plan d'alimentation

PRÉPARATION DE LA BUVÉE AU SEAU OU AU MÉLANGEUR

- Verser progressivement l'aliment d'allaitement (AA) dans l'eau à 50 °C et brasser énergiquement 1 à 2 mn.
- Distribuer la buvée lorsque sa température est de 42 ° C.
- Au DAL : suivre les préconisations du fabricant.

NE PAS OUBLIER

- Dès le 4^{ème} jour, distribuer à volonté eau, aliment concentré 1er âge et paille renouvelés fréquemment
- Apport de Vitalcure : 10 g/repas d'AA pendant les 10 premiers jours
- Apport de Vitalfort : 50 g dans 2 l d'eau distribués entre les 2 repas d'AA, les 7 premiers jours

Pour toutes questions complémentaires, consulter votre distributeur

SEMAINE	BUVÉE (L)	NBR DE REPAS	G/L DE BUVÉE
0-3 jours	Colostrum		
4-7 jours	2	2	175
Semaine 2	3	2	175
Semaine 3	4	2	175
Semaine 4	4	1	175
Semaine 5	4	1	175
Semaine 6	4	1	175
Semaine 7	4	1	175
Semaine 8	2	1	175

RECOMMANDATIONS

- Prolonger d'une semaine le plan d'alimentation (à l'identique de la semaine 9) si un veau ne consomme pas 2 kg d'aliment concentré 1er âge/j.
- Volume de buvée : pour les veaux de races spécifiques, consulter votre distributeur.
- Concentration de la buvée :
 - 125 g/l de buvée est équivalent à 140g/l d'eau
 - 175 g/l de buvée est équivalent à 200 g/l d'eau
 - Par temps froid, la concentration doit être augmentée de 10%.
- Le passage à 1 repas peut être plus précoce, consulter votre distributeur.